

Архів Чи можна вводити кілька вакцин одночасно?


Переглядів: 546

15 грудня 2021

Одночасне введення кількох вакцин або використання багатокомпонентних (тих, які захищають від кількох хвороб) – це нормальна світова практика. Віруси, що містяться у вакцинах, значно ослаблені й не можуть перевантажити імунну систему. Дитина піддається значно більшому навантаженню на імунітет, коли хворіє на застуду або ангіну, ніж від вакцин.


Навіть якщо одночасно зробити щеплення проти 10 інфекційних захворювань, буде задіяно лише 0,1 % імунної системи. Основні переваги введення відразу кількох вакцин – це скорочення кількості відвідувань поліклініки, зростання ймовірності того, що рекомендовані щеплення будуть зроблені дітям з дотриманням графіка. Щеплення треба робити в різні ділянки тіла: наприклад, у праве та ліве плече, а малюкам — у праве та ліве стегно. Щеплення в сідницю не роблять!

Правила поєднання вакцин і/або анатоксинів для профілактики різних інфекційних хвороб в Україні визначені наказом МОЗ №595 від 16.09.2011 (зі змінами, внесеними наказом [МОЗ №551 від 11 серпня 2014 року](#)).



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
УКРАЇНИ

ЧИ МОЖНА ВВОДИТИ КІЛЬКА ВАКЦИН ОДНОЧАСНО?*



Поєднання вакцин або використання багатокомпонентних - це нормальна світова практика. Вона дозволяє зменшити кількість візитів до лікаря, тож і рівень стресу для дитини та батьків. Правила поєднання вакцин для профілактики різних інфекційних хвороб в Україні визначені наказом МОЗ України № 595 від 16.09.2011 (у редакції наказу МОЗ № 551 від 11 серпня 2014 року).

Дві та більше інактивовані вакцини	Можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з будь-яким інтервалом між введенням доз відповідно до інструкції про застосування.
Живі вакцини + інактивовані	
2 живі вакцини (ін'єкції) (крім БЦЖ)	Вакцини можуть бути введені одночасно в різні ділянки тіла або з інтервалом не менше 1 місяця.
БЦЖ з іншими вакцинами	БЦЖ не роблять в один день з іншими вакцинами. Інші щеплення можна робити з інтервалом не менше 1 місяця до або після щеплення вакциною БЦЖ (крім вакцинації проти гепатиту В).